

Recenzja

J. GUERRA & R. M. CROS (koordynacja i redakcja). 2005. **Flora briofítica ibérica. Pottiaceae: Stegonia, Pottia, Microbryum**. [Fasc. 5 – R. M. Ros & O. Werner]. 35 str., 8 ryc. Miękka opr., format 19,5 × 27,5 cm. Sociada Española de Briología, Murcia. Cena: 10 €. ISSN 1696-0521.

J. GUERRA & R. M. CROS (koordynacja i redakcja). 2005. **Flora briofítica ibérica. Pottiaceae: Scopelophila, Anoetangium, Barbula, Leptodontium, Triquetrella**. [Fasc. 10 – A. Eder, J. Guerra, M. Brugués & R. Garilleti]. 27 str., 6 ryc. Miękka opr., format 19,5 × 27,5 cm. Sociada Española de Briología, Murcia. Cena: 10 €. ISSN 1696-0521.

J. GUERRA & R. M. CROS (koordynacja i redakcja). 2005. **Flora briofítica ibérica. Pottiaceae: Timmiella, Bryoerythrophyllum, Cinclidotus, Diallytrichia**. [Fasc. 11 – A. Soria, D. Gómez, E. Ron, J. Guerra, M. T. Gallego, A. Eder & F. Lara]. 32 str., 7 ryc. Miękka opr., format 19,5 × 27,5 cm. Sociada Española de Briología, Murcia. Cena: 10 €. ISSN 1696-0521.

W 2005 r. ukazały się trzy dalsze zeszyty Flory mszaków Półwyspu Iberyjskiego¹, a ich charakterystyczne pomarańczowe okładki wskazują, że obejmują one gatunki z rodziny Pottiaceae. Włączony został do niej także rodzaj *Cinclidotus*, który najczęściej zaliczany jest do odrębnej rodziny Cinclidotaceae. Ogółem w trzech omawianych fascykułach znalazły się opracowania 12 rodzajów, które obejmują łącznie 35 gatunków i jedną odmianę. Najbogatszymi w gatunki są tu rodzaje *Microbryum* (7 gatunków) i *Pottia* (6 gatunków), podczas gdy 4 rodzaje mają po jednym gatunku na badanym obszarze (*Stegonia*, *Anoetangium*, *Leptodontium*, *Triquetrella*). Rodzaje *Scopelophila* i *Diallytrichia* obejmują natomiast po 2, *Timmiella* i *Cinclidotus* po 3, a *Bryoerythrophyllum* i *Barbula* po 4 gatunki. Wszystkie gatunki należą do dobrze zdefiniowanych i zbadanych pod względem taksonomicznym, a ich ujęcia są bezdyskusyjne i dobrze ugruntowane w literaturze. Jediną nowością taksonomiczną jest podniesienie odmiany *Diallytrichia mucronata* var. *fragilifolia* Bizot & J. Roux do rangi gatunku.

Opracowania poszczególnych taksonów przygotowane są dokładnie według tych samych schematów i wzorów jakie przyjęte zostały w opublikowanych już fascykułach. Wszystkie gatunki zostały zilustrowane bardzo dobrymi rycinami kreskowymi, a na specjalną uwagę zasługuje bardzo dobra ikonografia kilku słabiej znanych gatunków, np. *Pottia wilsonii*, *Microbryum floerkeanum*, *M. curvicolle*, *M. rectum*, *Timmiella flexiseta* czy *Bryoerythrophyllum campylocarpum*. Dla większości nazw taksonów cytowane są typy nomenklatoryczne, ale niekiedy powoływanie się na wcześniejsze typizacje jest niewłaściwe, np. zaproponowana przez R. H. Zandera w 1978 r. typizacja *Weissia recurvirostra* jest całkowicie niepoprawna. – RYSZARD OCHYRA, ul. Gołaśka 15/25, 30-619 Kraków, Polska.

¹ Patrz recenzje R. Ochyry, *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 10: 92 (2003), 11: 438–439 (2004) i 12: 22 (2005).